

Broilereilta eristettyjen *E. faecalis* -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2008 (n=202)

Antibiootti	%R	95%C.I.	MIC (mg / l) arvojen % jakautumat															
			0,13	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	>2048
Ampisilliini	0,0	0,0-2,3		0,5	11,9	85,6	2,0											
Basitراسيini	33,7	27,3-40,7				1,5	2,5	10,9	37,6	10,9	3,0	4,0	10,4	19,3				
Erytromysiini	25,9	20,1-32,6			20,4	16,4	22,4	14,9	9,5	9,5	3,0	0,5	3,5					
Gentamysiini	0,0	0,0-2,3					2,0	2,5	42,1	52,0	1,5							
Kanamysiini	0,0	0,0-2,3								4,0	27,7	59,9	6,4	2,0				
Kloramfenikoli	0,0	0,0-2,3					0,5	55,9	43,1	0,5								
Linetsolidi	0,5	0,0-3,2			0,5	34,2	58,4	6,4	0,5									
Narasiini	38,6	31,9-45,7	2,0	24,8	23,3	3,5	7,9	15,8	20,3	2,0	0,5							
Streptomysiini	2,5	0,9-6,0								0,5	3,5	42,6	51,0		0,5	2,0		
Tetrasykliini	29,7	23,6-36,6			54,0	14,9	1,5		1,0	0,5	5,4	19,8	3,0					
Vankomysiini	0,0	0,0-2,3				13,9	59,9	26,2										
Virginiamysiini	0,0	0,0-2,3			1,5	1,0	3,0	5,0	53,5	35,6	0,5							