Tuotantoeläimistä eristettyjen *Salmonella* -bakteerien resistenssi antibiooteille vuonna 2009 (n = 22)*

			MIC (mg / l) arvojen % jakautumat																			
Antibiootti	%R	95%C.I.	≤ .008	.016	.032	.064	.125	.25	.5	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	> 2048
Ampisilliini	22,7	8,7-45,8							50,0	27,3						**22,7**						
Gentamysiini	0	0,0-18,5							4,5	86,4	9,1											
Kefotaksiimi	0	0,0-18,5				22,7	72,7	4,5														
Kloramfenikoli	13,6	3,6-35,9									4,5	81,8						**13,6**				
Nalidiksiinihappo	13,6	3,6-35,9										81,8	4,5					**13,6**				
Siprofloksasiini	13,6	3,6-35,9			22,7	63,6		**4,5**	**9,1**													
Streptomysiini	18,2	6,0-41,0											9,1	63,6	9,1	4,5	9,1	4,5				
Sulfametoksatsoli	22,7	8,7-45,8												72,7	4,5							**22,7**
Tetrasykliini	13,6	3,6-35,9								54,5	31,8			**4,5**	9,1							
Trimetopriimi	0	0,0-18,5						68,2	31,8													

**S*. Tennessee -rehuepidemian yhteydessä eristettyjen salmonellojen resistenssitulokset puuttuvat taulukosta.