**Broilereilta eristettyjen *E. coli* -bakteerien resistenssi antibiooteille vuonna 2011 (n=316).**

| | | | MIC-arvojen (mg $l^{-1}$) jakauma (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antibiootti** | **%R** | **95% C.I.** | **≤0,008** | **0,016** | **0,032** | **0,064** | **0,125** | **0,25** | **0,5** | **1** | **2** | **4** | **8** | **16** | **32** | **64** | **128** | **256** | **512** | **1024** | **>1024** |
| Ampisilliini | 3,8 | 2,1-6,7 | | | | | | | | 13,6 | 70,6 | 12,0 | | | | | | 3,8 | | | |
| Florfenikoli | 0,0 | 0,0-1,5 | | | | | | | | | | 25,0 | 72,2 | 2,8 | | | | | | | |
| Gentamisiini | 0,3 | 0,0-2,0 | | | | | | | 18,7 | 70,6 | 10,4 | 0,3 | | | | | | | | | |
| Kanamysiini | 11,7 | 8,5-15,9 | | | | | | | | | | | 88,3 | 3,8 | 7,9 | | | | | | |
| Kefotaksiimi | 0,0 | 0,0-1,5 | | | 2,5 | 63,3 | 29,5 | 4,7 | | | | | | | | | | | | | |
| Kloramfenikoli | 0,0 | 0,0-1,5 | | | | | | | | | 0,6 | 50,0 | 49,1 | 0,3 | | | | | | | |
| Kolistiini | 0,0 | 0,0-1,5 | | | | | | | 76,6 | 20,6 | 2,8 | | | | | | | | | | |
| Nalidiksiinihappo | 0,6 | 0,1-2,5 | | | | | | | | 1,9 | 35,8 | 58,9 | 2,8 | | 0,3 | | | 0,3 | | | |
| Siprofloksasiini | 0,6 | 0,1-2,5 | | | 47,2 | 52,2 | | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | | | | |
| Streptomysiini | 12,7 | 9,3-17,0 | | | | | | | | | | 4,4 | 71,2 | 11,7 | 1,6 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 4,1 | | |
| Sulfametoksatsoli | 10,8 | 7,7-14,9 | | | | | | | | | | | 87,6 | 1,3 | 0,3 | | | | | | 10,8 |
| Tetrasykliini | 7,9 | 5,3-11,6 | | | | | | | | 37,4 | 52,5 | 1,9 | 0,3 | | 0,3 | 1,9 | 3,8 | 1,9 | | | |
| Trimetopriimi | 9,5 | 6,6-13,4 | | | | | 1,3 | 12,3 | 53,5 | 22,8 | 0,6 | | | | 9,5 | | | | | | |