Sioilta eristettyjen *E. coli* -bakteerien resistenssi antibiooteille vuonna 2010 (n=250)

			MIC-arvojen (mg l^{-1}) jakauma (%)																		
Antibiootti	**%R**	**95% C.I.**	**≤0,008**	**0.016**	**0.032**	**0.064**	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**32**	**64**	**128**	**256**	**512**	**1024**	**>1024**
Ampisilliini	7.2	4,4-11,3								14.4	64.0	13.6	0.8				0.4	6.8			
Florfenikoli	0.4	0,0-2,6										28.8	66.4	4.4	0.4						
Gentamisiini	0.8	0,1-3,2						0.4	34.8	52.0	12.0	0.8									
Kanamysiini	3.6	1,8-7,0											96.4	2.4	1.2						
Kefotaksiimi	0.0	0,0-1,9		0.4	10.0	72.4	16.8	0.4													
Kloramfenikoli	0.8	0,1-3,2									2.4	47.6	47.6	1.6		0.4	0.4				
Kolistiini	0.0	0,0-1,9							88.4	11.2	0.4										
Nalidiksiinihappo	1.6	0,5-4,3								4.0	22.0	68.0	4.4			0.8	0.4	0.4			
Siprofloksasiini	1.6	0,5-4,3		8.0	77.6	12.8	0.8	0.4	0.4												
Streptomysiini	14.8	10,8-20,0									0.4	18.8	55.6	10.4	2.8	2.8	2.8	4.4	2.0		
Sulfametoksatsoli	12.4	8,7-17,3											84.0	2.8	0.8						12.4
Tetrasykliini	18.8	14,3-24,3								40.8	38.4	2.0		0.4	5.2	7.2	4.8	1.2			
Trimetopriimi	10.8	7,4-15,5					2.8	10.4	44.8	28.8	2.4	0.4			10.4						