Naudoista eristettyjen *Enterococcus faecium* -bakteerien mikrobilääkeresistenssi vuonna 2012 (n=155)

			MIC-arvojen (mg l^{-1}) jakauma (%)															
Antibiootti	**%R**	**95% C.I.**	**≤0,125**	**0,25**	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**32**	**64**	**128**	**256**	**512**	**1024**	**2048**	**>2048**
Ampisilliini	0,0	0,0-3,0		5,2	14,8	63,9	16,1											
Basitrasiini	2,5	0,8-6,9				1,3		1,9	21,3	39,4	33,5	1,9		0,6				
Erytromysiini	39,3	31,7-47,6			14,8	3,2	8,4	34,2	24,5	14,2	0,6							
Gentamisiini	0,6	0,0-4,0					0,6	9,7	63,2	24,5	1,3	0,6						
Kanamysiini	0,0	0,0-3,0									1,9	27,1	41,9	20,6	8,4			
Kloramfenikoli	0,0	0,0-3,0					0,6	40,6	54,2	4,5								
Linetsolidi	0,0	0,0-3,0				1,3	52,3	46,5										
Narasiini	0,0	0,0-3,0		14,8	62,6	21,9	0,6											
Streptomysiini	0,6	0,0-4,0							0,6		26,5	49,7	22,6	0,6				
Tetrasykliini	5,8	2,9-11,1			90,3	3,2		0,6			2,6	3,2						
Vankomysiini	0,0	0,0-3,0				80,6	16,8	2,6										
Virginiamysiini	0,6	0,0-4,0			32,3	20,6	41,3	5,2	0,6									