Sioista eristettyjen Enterococcus faecium -bakteerien mikrobilääkeresistenssi vuonna 2013 (n=41)

			MIC-arvojen (mg l^{-1}) jakauma (%)															
Antibiootti	**%R**	**95% C.I.**	**≤0,125**	**0,25**	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**32**	**64**	**128**	**256**	**512**	**1024**	**2048**	**>2048**
Ampisilliini	0,0	0,0-10,7		9,8	7,3	61	12,2	9,8										
Basitrasiini	2,4	0,1-14,4					4,9		12,2	56,1	24,4			2,4				
Erytromysiini	36,6	22,6-53,1			9,8	2,4	7,3	43,9	19,5	7,3	7,3		2,4					
Gentamisiini	0,0	0,0-10,7						17,1	63,4	19,5								
Kanamysiini	4,9	0,9-17,8									2,4	19,5	46,3	19,5	7,3		2,4	2,4
Kloramfenikoli	0,0	0,0-10,7						22	78									
Linetsolidi	0,0	0,0-10,7					65,9	34,1										
Narasiini	0,0	0,0-10,7		7,3	51,2	41,5												
Streptomysiini	2,4	0,1-14,4									19,5	63,4	14,6			2,4		
Tetrasykliini	9,8	3,2-24,1			51,2	39						9,8						
Vankomysiini	0,0	0,0-10,7				90,2	4,9	4,9										
Virginiamysiini	0,0	0,0-10,7			29,3	12,2	56,1	2,4										