

## HUKKAKAURAN TORJUNTA-AINEET

16.6.2016

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on koonnut hukkakauran torjuntaan käytettävät valmisteet alla olevaan taulukkoon. Tiedot pohjautuvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Tukes, kasvinsuojeluineregisterin tietoihin. Ennen käyttöä kannattaa aina varmistaa käyttö, käyttöohjeet ja vesistörajoitukset Tukesin sivuilta.

Kauppavalmiste/markkinoija	Käyttö
<b>Hukkakauran torjuntaan viljoilta</b>	
<b>X - Axial 50 EC</b>	ohra, vehnä, ruis, ruisvehnä
<b>X - Maatilan Pinoksadeeni ja Maatilan Pinoksadeeni 2</b> (alkuperäisvalmiste Axial 50 EC)	ohra, vehnä, ruis, ruisvehnä
<b>X – Maatilan S-Sulfuroni</b> (alkuperäisvalmiste Monitor)	syys- ja kevätvehnä, peruna
<b>X – Monitor</b>	syys- ja kevätvehnä, peruna
<b>Puma Extra</b>	ohra, vehnä, ruis, ruisvehnä
<b>X – Swipe</b>	ohra, vehnä, ruis, ruisvehnä
<b>Glyfosaattivalmisteet</b>	
Envision, Roundup Max, Roundup Bio, Roundup Gold, Rambo 360 ja 360 S, Glyfokem 360 ja Glyfokem Bio 45, Glyfonova Bio, Touchdown Premium jne. Yli 30 valmistetta	kesannot, viljelemättömät alueet, puutarhat käyttö kunkin valmisteen ja pakkauksen ohjeen mukaisesti
<b>Hukkakauran torjuntaan erikoiskasveilta</b>	
<b>Agil 100 EC</b>	leveälehtiset viljelykasvit, mm. öljykasvit, peruna, sokerijuurikas, herne, porkkana härkäpavulle vain Agil. Huom. varoajat 21-90 vrk
<b>Aramo</b> (toistuvan käytön rajoitus)	papu, sokerijuurikas, rapsi, porkkana, herne, sipuli, purjosipuli, punanata, kaali, peruna, taimitarhat
<b>X – Attribut 70 SG</b>	syys- ja kevätvehnä
<b>X – Broadway</b> (toistuvan käytön rajoitus) <a href="#">tehoaa vain taimella oleviin hukkakauroihin</a>	rukiilta ja vehnältä
<b>X – Clamox</b> (BASF, K-Maatalous) + <b>Dash-kiinnite</b>	Imatsamoksia kestäville CLEARFIELD (CL) kevätrypsi- ja kevät- ja syysrapsilajikkeet
<b>X – Focus Ultra</b>	leveälehtiset, mm. peruna, herne, rypsi, rapsi, sokerijuurikas, ja taimitarhat, havu- ja lehtipuiden viljelyalueet Huom. varoajat 55-65 vrk
<b>X – Fusilade Max</b>	hedelmäpuiden ja koristepuiden ja -pensaiden alustoilta sekä punanadan siemenviljelyksiltä
<b>X – Laser Ultra</b>	rypsiltä, rapsilta, sokeri- ja rehjuurikkaalta, punajuurikkaalta, maissilta, pavuilta, herneeltä, parsaa-, ruusu-, kukka-, lehti-, kiinan-, kurttu- ja rehukaalilta, lantulta ja nauriilta, perunalta, porkkanalta, sipulilta, purjolta, pellavalta, omena- ja päärynäviljelyksiltä, mansikalta, punanadan ja jäykkänadan siemenviljelyksiltä sekä apilan

	ja sinimailasen siemenviljelyksiltä
<b>X – Maatilan Karbatsoni</b> (alkuperäisvalmiste Attribut 70 SG)	syys- ja kevätvehnällä
<b>Maatilan Propafop</b> (alkuperäisvalmiste Agil 100 EC)	leveälehtiset viljelykasvit, mm. öljykasvit, peruna, sokerijuurikas, herne, porkkana
<b>X – Maatilan Pyroksulaami Duo ja Maatilan Pyroksulaami Duo 2 ja 3</b> (alkuperäisvalmiste Broadway) (toistuvan käytön rajoitus) <b>tehoaa vain taimella oleviin hukakauroihin</b>	rukiilta ja vehnältä
<b>Pilot Ultra</b> (alkuperäisvalmiste Targa Super 5 SC)	herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka. Huom. ei palkoineen korjattavalla herneellä, kuminaa saa käsitellä vain kylvövuonna, mansikkaa saa käsitellä vain sadonkorjuun jälkeen. Pitkän varoajan vuoksi ei sovi aikaisille rypsi ja rapsilajikkeille. Käsitellyn punanadan olkea ei saa käyttää rehuna
<b>X – Select</b>	sipuli-, porkkana- ja mansikkaviljelyksiltä sekä puuvartisten kasvien taimitarhoilta
<b>X – Select Plus</b> (toistuvan käytön rajoitus)	kepasipuli-, porkkana-, sokerijuurikas-, rehujuurikas, punajuurikas-, peruna-, keräkaali-, pellava-, rypsi-, rapsi-, herne-, papu- ja mansikkaviljelyksiltä. Huom. ei saa käyttää tuoreena korjattavalla herneellä.
<b>X – Stratos Ultra</b> (alkuperäisvalmiste Focus Ultra)	leveälehtiset, mm. peruna, herne, rypsi, rapsi, sokerijuurikas, ja taimitarhat, havu- ja lehtipuiden viljelyalueet. Huom. varoajat 55-65 vrk
<b>Targa Super 5 SC</b> (alkuperäisvalmiste Pilot Ultra)	herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka. Huom. ei palkoineen korjattavalla herneellä, kuminalle vain kylvövuonna, mansikalle vain sadonkorjuun jälkeen. Pitkän varoajan vuoksi ei sovi aikaisille rypsi ja rapsilajikkeille. Käsitellyn punanadan olkea ei saa käyttää rehuna

## **X = Käyttö kielletty tai rajoitettu pohjavesialueilla**

\* \* Glyfosaatit: tarkista valmisteiden pohjavesirajoitus. Eräitä valmisteita saa käyttää vain pesäkekäsittelynä.

Noudattakaa aina käyttöohjetta. Ohjeet löydätte myyntipäällyksestä tai markkinoijan kasvinsuojeluoppaasta. Käyttöohjeet on luettava huolellisesti ja torjunnan jälkeistä tarkastusta pelloilla ei saa unohtaa.

Suojaetäisyys vesistöön kaikilla valmisteilla 3 metriä. Lisätietoja vesistörajoituksista löytyy Tukes:n sivulta <http://www.tukes.fi/vesistorajoitus>

Käyttö suojaviljassa on selvittävää myyjältä / valmistajalta / maahantuojalta