

Kvalitetsfordring för sjukdomsbestämningarna som görs vid enheten för frökontroll

KORN

<u>Gränsvärden för flygsot på korn:</u>	<u>Utfärdade anvisningar/föreskrifter</u>
< 0.3 % förorenade frön	ingen anmärkning
0.3 - 0.9 % förorenade frön	betningsrekommendation
1.0 % eller mera förorenade frön	marknadsföring endast tillåten betat med ett medel som är effektivt mot flygsot

Strimsjuka och utsädesburen bladfläcksjuka på korn:

5 % eller mera smittade frön; betningsrekommendation ges.

HAVRE

Havreflygsotsbestämning görs i laboratoriet på samtliga sorter av alla basutsädesklasser (B1, B2 och B3).

<u>Gränsvärden för havreflygsot:</u>	<u>Utfärdade anvisningar/föreskrifter</u>
< 1000 sporer/g frön	ingen anmärkning
1000 - 5000 “	betningsrekommendation
> 5000 “	marknadsföring endast tillåten betat med ett medel som är effektivt mot sotsjuka

VETE

Stinksot får inte förekomma överhuvudtaget.

OLJE- OCH SPÅNADSVÄXTER

Högsta innehåll av frön infekterade med sjukdomar (%)

<u>Växtart</u>	<u>Gråmögel <i>Botrytis</i> spp.</u>	<u><i>Alternaria linicola</i>, <i>Ascochyta linicola</i>, <i>Colletotrichum lini</i>, <i>Fusarium</i> spp.</u>
Hampa	5	
Solros	5	
Lin	5	5*

* andelen frön infekterade med *Ascochyta linicola* får vara högst 1 %.