

## Siemenerien laatuvaatimukset kasvitautien suhteen

### OHRA

<u>Ohranlentonoen raja-arvot:</u>	<u>Annettu ohje/määräys</u>
< 0.3 % saastuneita siemeniä	ei huomauttamista
0.3 - 0.9 % saastuneita siemeniä	peittaussuositus
1.0 % tai enemmän saastuneita siemeniä	markkinointi sallittu ainoastaan lentonokeen tehoavalla aineella peitattuna

### Ohranviirutauti ja siemenlevintäinen ohranverkkolaikku:

Tartunta 5 % tai enemmän; annetaan peittaussuositus.

### KAURA

Kauranavonoki määritetään laboratoriossa kaikista lajikkeista kaikista perussiemenluokista (B1, B2 ja B3).

<u>Kauranavooen raja-arvot:</u>	<u>Annettu ohje/määräys</u>
< 1000 itiötä/g siemeniä	ei huomauttamista
1000 - 5000 “	peittaussuositus
> 5000 “	markkinointi sallittu ainoastaan nokitauteihin tehoavalla aineella peitattuna

### VEHNÄ

Haisunokea ei saa esiintyä lainkaan.

### ÖLJY- JA KUITUKASVIT

Tautien saastuttamien siementen määrä prosentteina (%) enintään

<u>Kasvilaji</u>	<u>Harmaahome</u> <u>Botrytis spp.</u>	<u>Alternaria linicola,</u> <u>Ascochyta linicola,</u> <u>Colletotrichum lini,</u> <u>Fusarium spp.</u>
Hamppu	5	
Auringonkukka	5	
Pellava	5	5*

\* *Ascochyta linicolan* saastuttamien siementen lukumäärä saa olla enintään 1 %.