Enheten för växtanalytik 30.6.2009

UTSÄDESSTATISTIK: GROBARHETS- OCH SJUKDOMSRESULTATEN 2008-2009

GROBARHET: stråsäd, år 2008 skörd, prov som granskats för certifiering

	Grobarhet obetat					Grobarhet betat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Korn	102	92,4	99	77	7	1286	94	99	68	36
Havre	496	88,5	100	51	102	574	90,9	99	50	63
Vårvete	41	87	98	60	11	344	92	99	69	26

GROBARHET: stråsäd, år 2008 skörd, odlarprov och packeriernas råpartiprov

	Grobarhet obetat					Grobarhet betat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.
Korn	302	89	100	15	68	282	90,9	100	13	30
Havre	342	80,3	99	7	176	141	84,3	99	34	55
Vårvete	143	79,9	99	23	73	133	85,5	98	21	41

GROBARHET: övriga arter, år 2008 skörd, prov som granskats för certifiering

Grobarhet obetat					
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Timotej	481	88	98	29	48
Ängssvingel	118	90,3	98	40	5
Rödklöver *	33	79,3(8,1)	93(4)	54(0)	27

* Inom parentes uppges procentandelen ogrodda (=hårda) frön som ingår i grobarhetsprocenten

Grobarhet betat					
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Rybs	55	89,8	97	79	6

KORNETS flygsot

Förorening	st.	%
<0,3 %	147	81,7
0,3-0,9 %	27	15,0
≥1 %	6	3,3
Tot.	180	

KORNETS strimsjuka och utsädesburna bladfläcksjuka

Förorening	st.	%
<5 %	128	76,2
≥5%	40	23,8
Tot.	168	

Uppdateras två gånger per månad