Enheten för växtanalytik 30.6.2010

UTSÄDESSTATISTIK: GROBARHETS- OCH SJUKDOMSRESULTATEN 2009-2010

GROBARHET: stråsäd, år 2009 skörd, prov som granskats för certifiering

	Grobarhet obetat					Grobarhet betat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Korn	133	93	99	76	5	1066	95,4	99	74	7
Havre	447	93	99	75	22	316	94,7	99	72	9
Vårvete	75	89,4	98	73	15	453	93,5	97	78	10

GROBARHET: stråsäd, år 2009 skörd, odlarprov och packeriernas råpartiprov

	Grobarhet obetat					Grobarhet betat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.
Korn	271	90	99	10	38	190	90,7	99	11	29
Havre	200	86,4	98	57	67	61	87,7	97	68	17
Vårvete	151	86,4	99	53	45	116	91	99	67	16

GROBARHET: övriga arter, år 2009 skörd, prov som granskats för certifiering

	Grobarhet obetat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Timotej	449	90,6	99	42	18
Ängssvingel	95	90,6	97	69	2
Rödklöver *	41	86(9)	97(17)	65(6)	9

* Inom parentes uppges procentandelen ogrodda (=hårda) frön som ingår i grobarhetsprocenten

	Grobarhet betat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Rybs	121	93,8	99	80	5

KORNETS flygsot

Förorening	st.	%
<0,3 %	117	76,0
0,3-0,9 %	26	16,9
≥1 %	11	7,1
Tot.	154	

KORNETS strimsjuka och utsädesburna bladfläcksjuka

Förorening	st.	%
<5 %	98	63,6
≥5%	56	36,4
Tot.	154	

Uppdateras två gånger per månad