

## ANVISNING

Tillsynsavdelningen  
Utsädeskontrollsenheten

Pvm/Datum/Date  
1.4.2015

Dnro/Dnr/DNo  
13055

Utsädespackerierna

**FÅNG- OCH BOTTENGRÖDOR VID UTSÄDESPRODUKTION AV VALL- OCH VALLBALJ-VÄXTER**

Fång-/bottengrödorna påverkar vallens förfrukter på samma sätt som vilket annat utsäde som helst som såtts på skiftet.

Om t.ex. rödklöver sås våren 2015 som bottengröda på en åker och beståndet bryts i oktober 2015, kan utsädesproduktion av rödklöver inte anläggas på skiftet förrän år 2019. Enda undantaget till detta är om rödklövern som valts som botten-/fånggröda anläggs med certifierat utsäde (t.ex. sorten Bjursele), och också utsädesproduktionen sker med samma sort (i detta fall Bjursele). I så fall inverkar bottengrödan naturligtvis inte på utsädesproduktionen. (Rödklöverns förfruktskrav är tre år. Detta innebär att det måste ha gått tre år sedan rödklöver senast odlades på skiftet. För flerårig utsädesvall räknas anläggningsåret inte som förfruktsår.)

Som fånggröda kommer man sannolikt i stor utsträckning att använda italienskt rajgräs. Rajgräsen frön är av samma form och vikt som svingelns frön, vilket gör det synnerligen svårt, för att inte säga omöjligt, att sortera ut rajgräsfrön ur frö av ängssvingel eller rörsvingel. På samma sätt är det så gott som omöjligt att sortera ut frön av andra rajgräsarter ur westerwoldiskt rajgräs.

Därför rekommenderar vi starkt att man, om man anlägger utsädesodlingar av svingel eller rajgräs, också iakttar två års förfruktskrav mellan paren

- ängs-/rörsvingel - rajgräs
- westerwoldiskt rajgräs – övriga rajgräsarter.

Arealen kan förkastas vid odlingsgranskningen om förekomsten av arter som är svåra att sortera ut är riklig.

## Tilläggsuppgifter

Leena Pietilä, tfn 040 833 2481  
Maarit Markkula, tfn 040 846 9148

Enhetsdirektör

Hanna Kortemaa

Överinspektör

Leena Pietilä